



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

DMS : 173

โรงพยาบาลศรีนครินทร์
รับที่... 4491/65
วันที่... 9 มี.ค. 2565
เวลา... 14:58

2421

ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โทร. 63587, 63362

ที่ อว 660301.6.1.10/ 120

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอบปรับแนวทางการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในคณะแพทยศาสตร์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

เรียน รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ตามที่ สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง ขอบแจ้งแนวทางการคัดกรอง
บุคคลภายนอกก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในคณะแพทยศาสตร์ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019 (COVID-19) ดังความแจ้งแล้วนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเป็นไปตามมาตรการของ
จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564-เมษายน 2565 พบว่ามีบุคคลภายนอก 2,090 คน ผ่านการคัดกรอง
2,081 คน ไม่ผ่านการคัดกรอง 9 คน (กลุ่มผู้รับเหมาช่วงปรับปรุงพื้นที่) แบ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
ได้แก่ 1) ส่งมอบครุภัณฑ์ ซ่อม และตรวจสอบครุภัณฑ์ (1-3 วัน) 663 คน 2) ตรวจสอบงานวิจัย
ปฏิบัติงาน (1-2 วัน) 399 คน 3) ปรับปรุงพื้นที่ (1-3 เดือน) จำนวน 315 คน 4) ติดตั้ง ซ่อม และตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ (5-14 วัน) 182 คน 5) ผู้แทนเวชภัณฑ์ยาเข้าพบเภสัชกร (15 นาที) 137 คน b) เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ และเข้าพบบุคลากรเพื่อนำเสนอครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (1-2 วัน) 67 คน กิจกรรมที่ปฏิบัติงาน
ดูแลผู้ป่วย ได้แก่ 1) เข้าร่วมในทีมผ่าตัด (1 วัน) 327 คน และในเดือน เมษายน 2565 พบว่าบุคคลภายนอก
ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ร้อยละ 100 และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นร้อยละ 80 จึงใคร่ปรับแนวทางการคัดกรอง
บุคคลภายนอกก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในคณะแพทยศาสตร์ โดยสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จะดำเนินการคัดกรอง 1) กลุ่มผู้มาปฏิบัติงานระยะเวลามากกว่า 30 วัน 2) กลุ่มที่ต้องเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
รายละเอียด ดังนี้

แนวทางคัดกรอง	ผู้รับผิดชอบ
กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย - ได้รับวัคซีนตามเอกสารแนบ 1 ให้ตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) COVID-19 สำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (home use) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน - ยังไม่ได้รับวัคซีนตามเอกสารแนบ 1 ให้แสดงผลตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) COVID-19 แบบใช้ในสถานพยาบาล (professional use) ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าปฏิบัติงาน	หน่วยงานประเมินก่อนเข้าปฏิบัติงาน
กรณีที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ต้องมีผลตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) COVID-19 แบบใช้ในสถานพยาบาล (professional use) ภายใน 24 ชั่วโมง	สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กรณีปฏิบัติงานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ให้แสดงผลตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) COVID-19 แบบใช้ในสถานพยาบาล (professional use) ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าปฏิบัติงาน	สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เอกสารแนบ 1 เงื่อนไขการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของบุคคลภายนอกก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในคณะแพทยศาสตร์

ชนิดวัคซีนเข็มที่ 1	ชนิดวัคซีนเข็มที่ 2	ชนิดวัคซีนเข็มกระตุ้น	ระยะเวลาที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้
CoronaVac (Sinovac) / COVILO (Sinopharm)	CoronaVac (Sinovac) / COVILO (Sinopharm)	mRNA / viral vector	1) ได้รับ 3 เข็ม โดยระยะห่างจากเข็มกระตุ้น ไม่น้อยกว่า 14 วัน
CoronaVac (Sinovac) / COVILO (Sinopharm)	AstraZeneca / COMIRNATY (Pfizer) / Moderna	mRNA / viral vector	1) ได้รับ 3 เข็ม โดยระยะห่างจากเข็มกระตุ้น ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ 2) ได้รับ 2 เข็ม โดยระยะห่างจากเข็มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่เกิน 3 เดือน
AstraZeneca	AstraZeneca	mRNA / viral vector	1) ได้รับ 3 เข็ม โดยระยะห่างจากเข็มกระตุ้น ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ 2) ได้รับ 2 เข็ม โดยระยะห่างจากเข็มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่เกิน 3 เดือน
AstraZeneca / COMIRNATY (Pfizer) / Moderna	COMIRNATY (Pfizer) / Moderna	mRNA / viral vector	1) ได้รับ 3 เข็ม โดยระยะห่างจากเข็มกระตุ้น ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ 2) ได้รับ 2 เข็ม โดยระยะห่างจากเข็มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่เกิน 6 เดือน
Janssen (Johnson & Johnson)		mRNA / Janssen (Johnson & Johnson)	1) ได้รับ 2 เข็ม โดยระยะห่างจากเข็มกระตุ้น ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ 2) ได้รับ 1 เข็ม โดยไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่เกิน 2 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

โรจน์ ไชยเอี้ยง

(รองศาสตราจารย์เนสินี ไชยเอี้ยง)

หัวหน้าสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

① *สวท มอช มท*

*เพื่อไปขอใบรับรอง วัคซีน
เจ้าหน้าที่วิธา / อาน / ๒๖๖๕*

จิราพร

๑ มด๖

จิราพร

ดำเนินการตามเสนอ

จิราพร